

HEKSORAL SPREY

KULLANIM KILAVUZU

FORMÜLÜ:

Etken Madde: Heksetidin %0.1

Yardımcı Maddeler: Ess. De menthe, mentol, etanol, sodyum sakarin, ponceau 4R.

TIBBİ ÖZELLİKLERİ:

Heksoral sprej, tiamin pirofosfatın sentezine mani olarak bakterileri yok eden bir antiseptiktir. Ağız ve boğazdaki yaralara çabuk ve doğrudan etki gösterir. Ağız ve boğaz yumuşak dokusuna karşı afinitesi yüksektir. Özellikle yumuşak dokulardaki 10-12 saat süren etkinliği dokuların rejenerasyonunda önemli rol oynar.

ÖNERİLEN KULLANIM YERİ:

Heksoral sprej, ağız ve boğazdaki enfeksiyonlarda tonsilit, larenjit, farenjit; diş çekiminden, tonsillektomi ve diğer ağız içi operasyonlarından sonra, stomatit, glosit, mykosen, gingivit, paradontit ve diş eti kanamalarında, gribal ve soğuk algınlığı hastalıklarında iyileştirmeyi destekleyici tedavide, süper enfeksiyonların önlenmesinde, aft ve mantar enfeksiyonlarında, ayrıca ağız kokusunu önlemek ve iyi bir ağız hijyeninin gerektiği hallerde kullanılır.

KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR:

Ürünün içerisindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olduğu bilinen bireylerde kullanılmamalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER:

Yeterli çalışma olmadığından gebelik ve laktasyonda kullanılmamalıdır.

Yeterli klinik çalışma olmadığından 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez.

Kullanmadan önce Kullanım Kılavuzu'nu dikkatlice okuyunuz. Kullanmakta olduğunuz ilaçlar var ise muhakkak doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER:

Çok uzun süreli kullanımlarda ağız tat duyumunda hafif ve geçici değişimler olabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Sağlık Bakanlığı Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER:

Bildirilen hiçbir vaka yoktur.

DOZ AŞIMI:

Yanlışlıkla içilse dahi doz aşımı bahis konusu değildir.

GÜNLÜK KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Heksoral sprey, bir defada 4 püskürtme (0.18 ml. = 0.18 mg.) günde 2-6 kez tekrarlanarak kullanılır. Tedavi süresi ortalama 6-7 gündür. Bu süre içinde olumlu sonuç alınmadığı takdirde hekime danışılmalıdır. Heksoral spreyin tavsiye edilen dozu (1 püskürtme mg.; günde 6 defa=1.08 mg.) oral dozun yaklaşık 5'te biridir. Bu nedenle sistematik aşırı doz veya toksisite bahis konusu değildir.

Kullanma Talimatı:

1. İlk kullanımda düzenli bir püskürtme elde edilinceye kadar pompalama düğmesine birkaç kez basın.
2. Ağızınızı iyice açın ve sprey borusunu ağızınıza sokarak hastalıklı bölgeye doğru yönlendirin.
3. İlacı püskürtmek için pompalama düğmesine süratle basın; bu işlemi 4 kez tekrarlayın.
4. Şişeyi kutusuna yerleştirip dik duracak şekilde saklayın.

HEKİME DANIŞMADAN KULLANMAYINIZ.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI:

30 ml.'lik sprey başlıklı plastik şişe ve kutuda.

25C°nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

İZİN TARİH VE NO: 13.04.2007 / 2007-13

İZİN SAHİBİ: Mega-Farma İlaç ve Kozmetik San. Tic. Paz. Ltd. Şti

Şerifali Mah. Emin Sk. No:6 Flexkon Plaza K:1 D:1 Ümraniye / İstanbul

ÜRETİM YERİ: Merkez Lab. İlaç San. Ve Tic. A.Ş.

Sırrı Çelik Blv. Ayşça Sk. No:6 Taşdelen Çekmeköy / İstanbul

SADECE ECZANELERDE SATILIR.